

Godkendelse af Dithane NT og ND Mastana SC til mindre anvendelse i blåbær

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen - Europa-Parlamentets og Rådets forordning Nr. 1107/2009 (EF) om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF

Ansvar for godkendelse til mindre anvendelse

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, som ikke er omfattet af midlets regelrette godkendelse.

Vejledning til mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen følges. Da Grøn Plantebeskyttelse ApS udarbejder og søger om godkendelse til mindre anvendelse og udarbejder vejledning på brugerens vegne, kan Grøn Plantebeskyttelse ApS ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle arter og sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Det kan derfor ikke udelukkes, at der kan opstå skader eller svigtende virkning, selvom vejledningen følges.

Vejledning for Dithane NT og ND Mastana SC i blåbær

Virkemåde:

Midlerne er bredspektrede svampemidler med kontaktvirkning. De virker forebyggende ved at lægge sig som en hinde på planten og forhindrer svampesporer i at spire.

Advarsel:

Nedenstående brugsanvisning til mindre anvendelse skal følges.
Godkendelse/vejledning til mindre anvendelse skal forefindes i eller ved kemikalierummet.
Midlets etikette skal læses, og advarsler, anvisninger m.m. skal følges.

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Dithane NT og ND Mastana SC i blåbær

Anvendelsesområde:

Dithane NT og ND Mastana SC må anvendes mod svampesygdomme (skivesvamp og filtrust) i blåbær.

Anvendelsestidspunkt og vilkår:

Ved begyndende angreb, efter varsling eller når skadetærskel er nået. Maks. 3 behandlinger pr. år (minimum 10 dages interval) i afgrødens vækststadium 13-97. Behandlingsfrist 30 dage.

Optimale virkningsforhold:

Temperatur: 15-20°C

Luftfugtighed: Høj

Timers tørvej: 2

Dosering:

2 kg/ha Dithane NT eller 3,6 l/ha ND Mastana SC.

September 2011