

Off-label godkendelse og vejledning til brug af Matrigon i jordbær

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler §3 og §5, Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003.

Ansvar for off-label vejledning

Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Grøn Plantebeskyttelse ApS udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Grøn Plantebeskyttelse ApS ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

Registreringsindehaveren/producenten kan ikke gøres ansvarlig for evt. skader eller svigtende effekt.

Vejledning for brug af Matrigon i jordbær

Ukrudtsmiddel:

Matrigon anvendes i jordbær til bekæmpelse af kamille, tidsler og andre kurvblomstrede ukrudtsarter.

Virkemåde:

Clopyralid er et systemisk herbicid, der primært optages via bladene. Det transporteres i sivævet rundt i hele planten, dvs. også ned i rodsystemet på flerårige ukrudtsarter. Clopyralid har auxinvirkning, og fremkalder en ukontrolleret vækst i følsomme ukrudtsarter.

Advarsel:

Læs Matrigon etiketten og følg anvisningerne.

Off-label vejledningens anvisninger skal overholdes.

Brugsanvisning for brug af Matrigon i jordbær

Anvendelsesområde:

Matrigon må kun anvendes til bekæmpelse af kamille, tidsler og andre kurvblomstrede ukrudtsarter.

Optimale virkningsforhold:

Temperatur på 10-12° C, god luft- og jordfugtighed og udsigt til 6 timers tørvej.

Anvendelsestidspunkt og vilkår:

Der må maksimalt foretages en behandling i hvert kulturforløb (3-4 år).

Behandlingen skal udføres som afskærmet sprøjtning i rækken for at have maksimalt plantedække.

Bedst effekt opnås på småt ukrudt i god vækst.

Behandlingen udføres efter høst dog senest den 15. august.

Dosering:

Der må maksimalt anvendes 0,25 l Matrigon/ha pr. behandling.

Maj 2010