

# Godkendelse af Fungazil TM 100 til mindre anvendelse i agurker i væksthuse til bekæmpelse af meldug

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen - Europa-Parlamentets og Rådets forordning Nr. 1107/2009 (EF) om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF*

## Ansvar for godkendelse til mindre anvendelse

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, som ikke er omfattet af midlets regelrette godkendelse.

### *Vejledning til mindre anvendelse - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen følges. Da Grøn Plantebeskyttelse ApS udarbejder og søger om godkendelse til mindre anvendelse og udarbejder vejledning på brugerens vegne, kan Grøn Plantebeskyttelse ApS ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle arter og sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Det kan derfor ikke udelukkes, at der kan opstå skader eller svigtende virkning, selvom vejledningen følges.

## Vejledning til mindre anvendelse af Fungazil TM 100

### *Virkemåde:*

Fungazil TM 100 er et systemisk svampemiddel, der virker ved at blokere svampens ergosterolbiosyntese.

### *Advarsel:*

Nedenstående brugsanvisning til mindre anvendelser skal følges. Godkendelse/vejledning til mindre anvendelse skal forefindes i eller ved kemikalierummet. Midlets etikette skal læses, og advarsler, anvisninger m.m. skal følges.

## Brugsanvisning til mindre anvendelse af Fungazil TM 100

### *Anvendelsesområde:*

Fungazil TM 100 anvendes i agurk i væksthuse til at bekæmpe ægte meldug.

### *Anvendelsestidspunkt og vilkår:*

Fungazil TM 100 anvendes forebyggende, eller så snart de første symptomer på angreb konstateres. Fungazil TM 100 har kun svag kurativ effekt.

Fungazil TM 100 må maks. anvendes 3 gange pr. kultur/sæson med 7 dages sprøjteinterval.

Sprøjtefristen er 3 dage før høst.

Der skal anvendes kemisk resistente handsker ved plukning af agurkerne.

### *Optimale virkningsforhold:*

Det er afgørende for midlets effekt, at der opnås en ensartet fordeling af midlet på alle overjordiske dele af planten.

### *Dosering:*

Der anbefales en dosering på 0,1 % styrke i 0,2 L vand pr. m<sup>2</sup>. Der må højst udbringes 0,20 kg imazalil/ha pr. sprøjtning.

Januar 2012