

Off-label godkendelse og vejledning til brug af Boxer EC i løg og porre

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler §3 og §5, Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003.

Ansvar for off-label vejledning

Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Grøn Plantebeskyttelse ApS udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Grøn Plantebeskyttelse ApS ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

Vejledning for brug af Boxer EC i løg og porre

Ukrudtsmiddel:

Boxer EC anvendes i løg og porre til bekæmpelse af en- og tokimbladet ukrudt.

Virkemåde:

Boxer EC (prosulfo carb) optages både via bladene og gennem rødderne og virker overfor såvel ny fremspiret ukrudt som overfor spirende ukrudt.

Advarsel:

Læs Boxer EC etiketten og følg anvisningerne.

Off-label vejledningens anvisninger skal overholdes.

Brugsanvisning for brug af Boxer EC i løg og porre

Anvendelsesområde:

Boxer EC anvendes i løg og porre til bekæmpelse af en- og tokimbladet ukrudt.

Vedrørende bekæmpelseseffekt over for de forskellige ukrudtsarter henvises til etiketten.

Optimale virkningsforhold:

Bekvem, ikke knoldet, jord giver bedst virkning af Boxer EC. Passende jordfugtighed giver gode virkningsbetingelser, men Boxer EC har dog også god virkning under tørre forhold.

Boxer EC bør ikke udsprøjtes i perioder med nattefrost.

Anvendelsestidspunkt og vilkår i bundtløg (løg med top), skalotteløg og tørre løg (inkl. rødøg):

Boxer EC kan anvendes forår eller efterår før fremspiring eller efter fremspiring/sætning.

Behandling efter fremspiring/sætning skal ske i perioden fra løgenes 1. løvblad er mindst 3 cm langt og indtil 3. blad er udviklet.

Behandlingen må ikke udføres senere end 60 dage før høst.

Der må maks. anvendes 4 l Boxer EC pr. ha pr. sæson.

Anvendelsestidspunkt og vilkår i porre:

Boxer EC kan anvendes før fremspiring eller efter fremspiring/ plantning.

Behandling efter fremspiring skal ske i perioden fra porrernes 1. løvblad er mindst 3 cm langt og til at 3. blad er udviklet. Behandling efter plantning må tidligst udføres 7 dage efter plantningen.

Behandlingen må ikke udføres senere end 80 dage før høst.

Der må maks. anvendes 4 l Boxer EC pr. ha pr. sæson.

Dosering:

Der anvendes en dosering på maks. 4,0 l Boxer EC pr. ha. i 200-400 l vand.

Maj 2009