

# Off-label godkendelse og vejledning til brug af Fenix i såløg

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler §3 og §5, Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003.*

## Ansvar for off-label vejledning

Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, som ikke er nævnt på midlets etikette.

### *Off-label vejledning - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Grøn Plantebeskyttelse ApS udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Grøn Plantebeskyttelse ApS ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

## Vejledning for brug af Fenix i såløg

### *Ukrudtsmiddel:*

Fenix anvendes i såløg til bekæmpelse af frøukrudt.

### *Virkemåde:*

Fenix (aclonifen) udsprøjtet før fremspiring optages under fremspiringen af kimblade og kimstængel hos tokimbladet ukrudt og af kimblade hos enkimbladet ukrudt. På fremspiret ukrudt optages aktivstoffet også over bladene.

Den synlige effekt på ukrudt ses få dage efter udsprøjtningen, hvor væksten stopper, planten affarves og visner bort.

### *Advarsel:*

Læs Fenix etiketten og følg anvisningerne.

Off-label vejledningens anvisninger skal overholdes.

## **Brugsanvisning for Fenix i såløg**

### *Anvendelsesområde:*

Fenix anvendes i såløg til bekæmpelse af en- og tokimbladet ukrudt. Vedrørende bekæmpelseseffekt over for de forskellige ukrudtsarter henvises til etiketten.

### *Optimale virkningsforhold:*

Bekvem, ikke knoldet, jord giver bedst virkning af Fenix. Passende jordfugtighed giver gode virkningsbetingelser. Optimal temperatur er over 10 grader celcius og ingen udsigt til nattefrost.

### *Anvendelsestidspunkt og vilkår i såløg:*

Fenix anvendes mod frøukrudt som led i en ukrudtsbekæmpelsesstrategi. Fenix anvendes fra løgene har udviklet 2 blivende blade. Behandlingen må ikke udføres senere end 90 dage før høst. Der må maks. anvendes 1 l Fenix pr. ha pr. sæson.

### *Dosering:*

1,0 liter Fenix pr. ha fra løgene har udviklet 2 blivende blade

Maj 2009