

# Brugsanvisning til mindre anvendelse af DFF (18-416), Quartz (18-514), Legacy 500 SC (396-26), Sempra (594-4) og Diflanil 500 SC (601-1) i kirsebær og blomme

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

## **Ansvar for mindre anvendelse og vejledning**

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

### *Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. Grøn Plantebeskyttelse kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

## **Vejledning for DFF (18-416), Quartz (18-514), Legacy 500 SC (396-26), Sempra (594-4) og Diflanil 500 SC (601-1) i kirsebær og blomme**

### *Ukrudtsmiddel:*

- Må kun anvendes i kirsebær og blomme til bekæmpelse af ukrudt
- Der skal anvendes afskærmet sprøjtning
- Behandlingsfrist
  - Etableringsårene (ingen høst): Midlerne må anvendes 1 gang om foråret før knopbrydning eller 1 gang om efteråret
  - Høstårene: Midlerne må anvendes 1 gang om efteråret efter høst og ikke senere end 8 måneder før høst
- Max 1 behandling med et diflufenicanholdigt middel pr. år
- Må ved doseringer op til 0,15 L/ha ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
- Må ved doseringer op til 0,25 L/ha ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

### *Advarsel:*

"Se midlernes etiketter".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

## **Brugsanvisning for DFF (18-416), Quartz (18-514), Legacy 500 SC (396-26), Sempra (594-4) og Diflanil 500 SC (601-1) i kirsebær og blomme**

*Skadegører:* Spirende og ny fremspiret ukrudt.

### *Dosering:*

	Dosis L/ha
1. sprøjtning	Max. 0,25 L/ha middel

### *Sprøjtetidspunkt og teknik/udstyr:*

Diflufenican optages af ukrudtets blade og virker ligeledes som kontaktmiddel. Ved udsprøjtning danner diflufenican en film på jordoverfladen, hvorfra det optages gennem kimstængelen ved fremspiring af nyt ukrudt. Herved opnås en effekt på endnu ikke fremspiret ukrudt. Bedst effekt fås ved udsprøjtning på fugtig jord. På humusjord kan der være nedsat effekt.

### *Antal behandlinger:*

Max 1 behandling med et diflufenicanholdigt middel pr. år

25 september 2014