

# Brugsanvisning til mindre anvendelse af MaisTer (18-442), LFS Foramsulfuron+Iodosulfuron+Isoxadifen (318-93) og Foram iodo (650-11) i æble, pære, blomme og kirsebær

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

## **Ansvar for mindre anvendelse og vejledning**

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

### *Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. Grøn Plantebeskyttelse kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

## **Vejledning for MaisTer (18-442), LFS Foramsulfuron + Iodosulfuron+ Isoxadifen (318-93) og Foram iodo (650-11) i æble, pære, blomme og kirsebær**

### *Ukrudtsmiddel:*

- Må kun anvendes i æble, pære, blomme og kirsebær til bekæmpelse af ukrudt
- Behandlingsfrist
  - Etableringsårene (ingen høst): Midlerne kan anvendes uden afskærmning før knopbrydning
  - Høstårene: Midlerne skal anvendes med fuld afskærmning før knopbrydning og ikke senere end 3 måneder før høst
- Max 2 behandlinger pr. sæson
- Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

### *Advarsel:*

"Se midlernes etiketter".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

## **Brugsanvisning for MaisTer (18-442), LFS Foramsulfuron + Iodosulfuron+ Isoxadifen (318-93) og Foram iodo (650-11) i æble, pære, blomme og kirsebær**

*Skadegører:* En række græsser inkl. kvik, samt bredbladet ukrudt.

### *Dosering:*

	Dosis g/ha
En sprøjtning*	Max. 150 g/ha middel
Splitsprøjtning*	Max. 150 g/ha middel. Ca. 2/3 af den planlagte dosering udsprøjtes, når ukrudtet står med 2-3 blade, efterfulgt af den resterende dosering 10-14 dage senere

\* Der tilsættes olie i hht. anbefaling på etiketterne.

### *Sprøjtetidspunkt og teknik/udstyr:*

Midlerne udsprøjtes om foråret, når der er vækst i ukrudtet, og temperaturen er over 8° C. Lunt vejr, og dermed god vækst i ukrudtsplanterne, fremmer en hurtig og sikker effekt. Midlerne er regnfaste efter 2 timers tørvejr.

Der bør ikke behandles med udsigt til nattefrost.

Splitbehandling er især en fordel ved kvikbekæmpelse, samt hvor der erfaringsmæssigt er risiko for ny fremspiring.

*Antal behandlinger:* Max 2

25 september 2014