

# Brugsanvisning til mindre anvendelse af Nissorun 250 SC (561-6) i prydplanter, jordbær, tomat, aubergine, peberfrugt, chilipeber, agurk, courgette, melon, græskar, squash og vandmelon i væksthuse

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

## **Ansvar for mindre anvendelse og vejledning**

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

### *Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. GartneriRådgivningen kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

## Vejledning for mindre anvendelse af Nissorun 250 SC (561-6) i pryddplanter, jordbær, tomat, aubergine, peberfrugt, chilipeber, agurk, courgette, melon, græskar, squash og vandmelon i væksthuse

### Spindemiddelemiddel:

- Må kun anvendes til bekæmpelse af spindemider i pryddplanter, jordbær, tomat, aubergine, peberfrugt, chilipeber, agurk, courgette, melon, græskar, squash og vandmelon i væksthuse, jf. skemaet i brugsanvisningen
- I jordbær, tomat, aubergine, peberfrugt, chilipeber, agurk, courgette, melon, græskar, squash, og vandmelon: ikke senere end 3 dage før høst
- Ved anvendelse i væksthuse må der ikke forekomme udledning af vand fra produktionen til miljøet eller til kloak. Plantemateriale og dyrkningsmedie til bortskaffelse skal opbevares tildækket og på tæt belægning
- Ved håndtering (og plukning) af pryddplanter dyrket i væksthuse skal der anvendes kemisk bestandige handsker

### Advarsel:

"Se Nissorun 250 SC etiketten".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

## Brugsanvisning for mindre anvendelse af Nissorun 250 SC (561-6) i pryddplanter, jordbær, tomat, aubergine, peberfrugt, chilipeber, agurk, courgette, melon, græskar, squash og vandmelon i væksthuse

Anvendelse: Bekæmpelse af spindemider

### Afgrøde, dosering, antal behandlinger, interval og sprøjtefrist

Afgrøde	Dosering pr. behandling	Antal behandlinger	Interval mellem behandlinger	Sprøjtefrist
Jordbær	Max 0,24 l/ha (=0,02 % styrke i 1200 l vand/ha*)	Max 1 pr. afgrøde	-	3 dage
Melon, græskar, squash og vandmelon	Max 0,30 l/ha (=0,02 % styrke i 1500 l vand/ha*)	Max 1 pr. afgrøde	-	3 dage
Tomat, aubergine, peberfrugt, chilipeber, agurk og courgette	Max 0,30 l/ha (=0,02 % styrke i 1500 l vand/ha*)	Max 2 pr. afgrøde	Min. 7 dage	3 dage
Pryddplanter	Max 0,30 l/ha (=0,02 % styrke i 1500 l vand/ha*)	Max 2 pr. kultur	Min. 7 dage	-

\*0,02 % opløsning (= 20 ml Nissorun 250 SC opløst i 100 l vand)

**Sprøjtetidspunkt:** Der behandles ved behov i hht. brugsanvisningen

### Forebyggelse af resistens:

Hvis Nissorun 250 SC anvendes mere end én gang **skal** midlet indgå i en strategi, hvor der imellem behandlingerne anvendes et spindemiddel med en anden virkemekanisme (f.eks. Floramite 240 SC) for at forebygge resistens.

**Risiko for skade:** Da der er begrænset erfaring med Nissorun 250 SC, bør midlet, ved anvendelse i nye kulturer og sorter, afprøves på et mindre antal planter først. Hermed fås erfaring med midlet og risikoen for skader reduceres.