

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Orius 200 EW (396-24) i solbær, ribs og blåbær

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. Grøn Plantebeskyttelse kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Orius 200 EW (396-24) i solbær, ribs og blåbær

Svampemiddel:

- Må kun anvendes i solbær, ribs og blåbær til bekæmpelse af svampesygdomme
- Må ikke anvendes senere end 14 dage før høst
- Max 1 behandling pr. sæson
- For at beskytte grundvandet må der i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende (læs etiketten)
- Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

Advarsel:

- "Se Orius 200 EW etiketten
- Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Orius 200 EW i solbær, ribs og blåbær

Anvendelse:

- Bekæmpelse af bl.a. rust (*Cronartium ribicola*) i solbær og ribs og Antracnose (*Colletotrichum*) i blåbær.

Dosering:

Orius 200 EW	Dosis l/ha
Sprøjtning	Max. 1,0

Sprøjtetidspunkt og teknik/udstyr:

- Orius 200 EW anvendes ved behov
- Midlet optages gennem bladene og føres systemisk rundt i planten
- De optimale virkningsforhold er en temperatur på ca. 20 °C (min. 6 °C) og 2 timers tørvejrs efter sprøjtning

Antal behandlinger:

- Max. 1 pr. sæson

26. juni 2015