

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Spruzit Neu insektmiddel (364-67) til økologisk produktion af hovedkål, rød- og hvidkløver til frø samt hestebønner til foder

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i
plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til mindre anvendelse følges. GartneriRådgivningen kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Spruzit Neu insektmiddel (364-67) til økologisk produktion af hovedkål, rød- og hvidkløver til frø samt hestebønner til foder

Insektmiddel:

- Må ikke anvendes senere end de sprøjtefrister for de forskellige afgrøder som er angivet i nedenstående tabel.
- Max 1 behandling for kløver i etableringsåret, ellers max 2 behandlinger pr. sæson med 7 dages interval
- Hvid- og rødkløver, der er behandlet i høståret, må ikke anvendes til opfodring
- Farligt for bier – for at beskytte bier og andre bestøvende insekter, må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder
- Må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

Advarsel:

”Se Spruzit Neu insektmiddel etiketten”.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Spruzit Neu insektmiddel (364-67) til økologisk produktion af hovedkål, rød- og hvidkløver til frø samt hestebønner til foder

Dosering, skadegører, antal behandlinger, sprøjtetidspunkt og sprøjtefrist

Afgrøder	Skadegører	Max dosering pr behandling	Max antal behandlinger	Sprøjte- tidspunkt	Sprøjtefrist (PHI)
Hovedkål	Sommerfugle Kålbladlus Trips Glimmerbøsser	6 L/ha	Max 2 behandlinger med 7 dages interval	Ved behov	3 dage
Hvid- og rødkløver til frø	Kløversnudebille	6 L/ha	Max 1 behandling i etableringsåret Max 2 behandlinger med 7 dages interval i høståret	Behandling skal foretages inden blomstringen begynder	-
Hestebønner til foder	Bedebladlus	Afgrødehøjde: < 50 cm: 6 L/ha Afgrødehøjde: >50 cm: 9 L/ha	Max 2 behandlinger med 7 dages interval	Behandling må ikke foretages i blomstringssperioden	3 dage

Sprøjtetidspunkt og teknik/udstyr: Behandlinger udføres uden for biernes flyvetid. Sprøjt aldrig i direkte sollys eller ved temperaturer under 5° C eller over 20° C.

Spruzit Neu er et kontaktmiddel. Effektiv virkning kræver optimal fordeling af sprøjtevæsken i afgrøden. Alle plantedele skal dækkes grundigt uden afdrypning. Vælg dyser der minimerer afdrift.

Risiko for skade: Udfør altid en tålsomhedsafprøvning første gang midlet anvendes i nye kulturer eller under nye vækstforhold.

1. juli 2016