

Off-label godkendelse og vejledning i brug af Teldor til bekæmpelse af svampe i blåbær

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning
i henhold til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler §3 og §5,
Miljøministerens bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003.*

Ansvar for off-label vejledning

Off-label godkendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Off-label vejledning - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om off-label vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Grøn Plantebeskyttelse ApS udarbejder og søger off-label godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Grøn Plantebeskyttelse ApS ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der måtte opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er off-label godkendt og den tilknyttede off-label vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en off-label godkendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når off-label vejledningen følges.

Vejledning for Teldor i blåbær

Svampemiddel:

Må kun anvendes i blåbær

Virkemåde:

Ikke systemisk svampemiddel, der primært skal anvendes forebyggende.

Advarsel:

Se Teldor etiketten

Off-label brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Teldor i blåbær

Anvendelsesområde:

Teldor anvendes til bekæmpelse af gråskimmel, Botrytis cinerea.

Anvendelsestidspunkt og vilkår:

Der behandles første gang under buskenes blomstringsperiode. Behandlingen kan herefter, afhængig af smittetryk, gentages 2 til 3 gange hvor sidste behandling senest må udføres ved modenhed i vækststadium 84-86. Minimum 10 dage mellem hver behandling. Behandlingsfristen er 7 dage.

Optimale virkningsforhold:

Bedste effekt af Teldor opnås ved:

- 20 °C (min. 10 °C)
- 90% luftfugtighed
- 2 timers tørvejrr efter behandling

Dosering:

Der anvendes en dosering på 1,50 kg Teldor WG 50 pr. ha.

Max. 4 sprøjtninger pr. sæson.

Bemærkning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Flakkebjerg:

Forskningscenter Flakkebjerg kan anbefale off-label anvendelse af Teldor efter ovenstående brugsanvisning.

Juli 2008